



○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○!

1. ஒரு நோய்க்குத் தரப்படும் மருந்தின் பக்க விளைவுகளே சிலவளே இன்னொரு நோயாக வளெரிப படலாம். இரூமலுக்குத் தரப்படும் சில மருந்துகள் தடுக்கத் தை தடுண்டும். சில மருந்துகள், சலூர்வு, அசுதி, மயக்கம், வயிறுறுப்புண், மட்டெவலி உண்டாக் கும்.
  
2. எடுத்தற கலெல்லாம் வலி நிவாரண மாத் திரகைளவை விழுவங் குவது குடல் புண்ணுக்கு விருந்து வதைது அழகைக் கும்.
  
3. நலூயபைப் பற்றியும் தரப்படும் மருந்துக்களின் தன்மைகளையும், பக்க விளைவுகளையும் பற்றி இணயை தளங்களில் பார்த்து திரெந்து கலாள்ளுவங் கள்.
  
4. மருத்துவர் பரிந்துரயென்றி மருந்துகள் வாங்கி சுய மருத்துவம் சயெயாதீ ர்கள். தவறாகப் பயன்படுத்தபடும் மருந்துகள் உயிரகைக் குடித்துவிடும்.
  
5. சில நலூயாளிகளுக்கு சில மருந்துகள் கலாடுக்கக் கட்டாது. சில மருந்தை சரேத்துக் கலாடுக்க வணெட்டியிருக்கும்.
  
6. மருந்தின் அளவு நலூயாளியின், வயது மற்றும் எடகைக்குத் தக்கபடி மாறுபடும்.
  
7. ஆண்டிபயாட்டிக் மாத் திரகைளவை அரகைறயாக சாப்பிட்டெ நிறுத்தக் கட்டாது. நலூய் கிருமிகள் அதிக பலம் பெற்றுவிடும்.

8. எழுத்ததற்கெல்லாம் ஆன் டிபயாடிக் மாத் திரகைகள் குழந்தகைகளுக்கு கொடுப்பது பிறகு தவேபை படும் நரேம் அந்த மருந்து சயெல் படாதவாறு நோய் கிருமிகள் அந்த மருந்தை எதிர்த்து நிற்கும் திறன் பெற்று விடுகின்றன.
9. மருந்துகள் ஊட்டச்சத்து அல்ல. தவேயை இனி உடலில் ஏற்றிக் கொள்ளக் கூடாது.
10. அலோபதி மருத்துவர் எழுதித்தரும் மருந்துகளுக்கு நிகரான ஆயுர்வதே மருந்துகளை நீங்களாக சாப்பிடாதீர்கள்.
11. நோயாளி அனுபவப்படுவது நோய்க் குறிகளைத் தான். அதனைக் கொண்டு மருந்தை தீர்மானிக்கக் கூடாது. ஒரு மருத்துவர் சரியாக ஆராய்ந்து, சில பரிசோதனைகள், சயெது நோயை தீர்மானித்து மருந்து கொடுப்பது தான் சரி.
12. காலாவதியான மருந்துக்களை தடுக்கி எறிந்து விடுங்கள்.
13. ஒரு முறை திறந்த குப்பி மருந்துகளை நீண்ட நாள் உபயோகிக்க வேண்டாம். குளிர் பதன பட்டியில் வைத்தால் கூட இரு வாரங்களில் சயெல் திறன் குறையை ஆரம்பிக்கும்.
14. மருந்து கொடுக்க சமயைல் கரண்டிகளை பயன்படுத்தாதீர்கள். அளவு மாறிவிடும்.
15. ஒருவர் உபயோகித்த மருந்தை இன்னொருவருக்குக் கொடுக்காதீர்கள்.
16. வரட்டு இருமலுக்கு கொடுத்த மருந்தை சளி இருமலுக்கு கொடுக்காதீர்கள். அதற்கு சளியை வெளியேற்றும் வேறு மருந்து உண்டு.

17. முன்பு காய்ச்சலுக்கு உபயோகித்த ஆன்டி-பயாடிக் மாத் திரகைகளை அடுத்தமுறை காய்ச்சல் வரும் வரை வதைத் திருந்து கொடுக்காதீர்கள்.

18. சில மருந்துகளின் பலன் உடனே தெரிவதில்லை. நோய்சீக்கிரம் குணமாக வணைபி அதிக அளவு மருந்து கொடுப்பது ஆபத்தில் முடியும். குடல் புண்ணாகி விடும்

19. அனகே ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் சாப்பாட்டிற்கு ஒரு மணி நேரம் முன் அல்லது பின் சாப்பிட வணைடும்.

20. மருந்தை மற்ற உணவுகளுடன் கலந்து சாப்பிடாமல் தண்ணீருடன் மட்டுமே சாப்பிடவும்.

21. மருந்துக்கள் குழந்தைகளுக்கு எட்டும்பி வகை வணைடாம். வீட்டில் மற்றவர்களின் மருந்துகளுடன் சேர்த்து வகை வணைடாம்.

22. நீங்கள் ஏற்கனவே எதாவது மருந்து தொடர்ந்து எடுத்துக் கொண்டிருந்தாலோ, கர்ப்பிணியாக இருந்தாலோ, வயிற்றுப்புண், சர்க்கரை, இரத்த அழுத்தம் இருந்தாலோ உங்கள் மருத்துவரிடம் தவறாமல் கறிவிடுங்கள். அதற்குறி மருந்துகள் எழுதித் தருவார்.

23. ஓரே நேரம் வெவ்வேறு மருத்துவர்களிடம் சிகிட்சை பெறாதீர்கள். உதாரணமாக பலவகைக்கு பல மருத்துவரிடம் போகிறீர்கள். அவர் ஒரு வலி நிவாரணி எழுதி தந்து அதை சாப்பிட்டு வருகிறீர்கள். அடுத்து மட்டும் வகை வணைடும் மருத்துவரிடம் போய் வலி நிவாரணி மருந்து வாங்கி அதையும் சாப்பிடும் போது மருந்து ஒவர்டோஸ் ஆகிவிடும்.

24. மருத்துவர்தரமும் மருந்துகள் அதே அளவில் அதே நேரத்தில் சாப்பிடவும்.  
நோயிலிருந்து சிறிது ஆசுவாசம் கிடைத்ததும் மருந்துக்களை நிறுத்தி விடக்கூடாது.

25. மருத்துவர்தரம் ஆலோசனைப்படி தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளை தவிர்த்து சரேக்க  
வேண்டியவகளை சரேத்து உண்ணவும்.

26. சில மருந்துகளை சாப்பிடும்போது சிலருக்கு ஓவ்வாமை ஏற்படலாம். உடனே அந்த  
மருந்தை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரிடம் சொல்லுங்கள்.

27. அவசரம் இல்லாத பட்சத்தில் இன்ஜெக்ஸனை விட வாய் வழி மருந்து தான்  
பாதுகாப்பு.

28. மருத்துவர்தரம் எழுதித்தந்து வாங்கிய மருந்தானாலும் அவரிடம் ஒருமுறை காட்டி சரி  
பார்த்துக்கொள்ளவும். போலி மருந்துகள் நிறைய மார்கட்டில் உள்ளன எச்சரிக்கையாக  
இருங்கள்.

29. மருத்துவர்தரம் விலையுரந்த சில கம்பனி மருந்துக்களை எழுதித்தந்தால் அதற்கு  
நிகரான ஜெனெரிக் மருந்துகள் உண்டா? என்று களேங்கள். ஜெனெரிக் மருந்துகள்  
பொதுவாக மிகவும் விலை குறைவாக கிடைக்கும். இரண்டிலும் ஒரே மருந்து தான்  
இருக்கும். உதாரணமாக "பனடால்" என்ற காய்ச்சல், வலி நிவாரண மாத் திரைக்கு நிகரான  
ஜெனெரிக் மாத் திரை "பரோசிட் மால்". பனடாலில் இருப்பது பரோசிட் மால் தான். இது  
பெரும் பணத்தலை மிச்சப்படுத்தும்.

30. மருத்துவர்தரம் எழுதித்தரமும் மாத் திரைகளின் ஒருமடங்கு டோஸ் கட்டிய மாத் திரைகள்  
பெரும் பாலும் அதே விலையில் கிடைக்கும். அதை வாங்கி பாதி மாத் திரை சாப்பிட்டால்,  
மாத் திரை சலெவு பாதியாகும். உதாரணமாக 40 mg மாத் திரைக்குப் பதில் 80 mg மாத் திரை  
வாங்கி பாதி சாப்பிடவும். ஆனால் குழாய் மாத் திரைகளையும், சிறப்பு பச்சு பச்சிய  
மாத் திரைகளையும் இம்முறையில் வெட்டிச் சாப்பிடத் தீர்கள். மருத்துவர்தரம் பரிந்துரை படி  
செய்யுங்கள்.

31. மருத்துவரர் மஶன்று வளேமை மாதத்திரை சாப்பிடச் சரொன்னால சலெவு கரூதி இரன்டு மாதத்திரை பரோதும் ஂன்று நீ றங்களாக சரூகக்கிகரெள் வது மிக ஆபத்தில் பரோய் முடியும்.

32. ரத்தக்கரொதிப்பு பரோன்ற நரோய்களுக்கு தரொடர்ந்து நீ றங்கள் மரூந்து சாப்பிட்டுக் கரொண்டிருக்கையில் மரூத்துவரிடம் களோமல் திடீ ரனெநெறறுத்துவது மிக ஆபத்தாகிவிடும்.

33. காய்ச்சலுக்கு மரூத்துவரிடம் சலெக்கிரீ கள். அவர் ஂழுதி தந்த மரூந்தில் நரோய் கரூணமாகவில்லை, அடுத்தமுறை சலெல்லும் பரோது அவர் வறூ மரூந்து ஂழுதி தரூவார். இப்பரோது நீ றங்கள் புதிய மரூந்துடன் மீ த மிருக்கும் பழய மரூந்தயும் சரேத்து சாப்பிடாதீ ர்கள். இப்பரோது ஂழுதித் தந்ததயை தேரொடரூங் கள்.

34. ஓரூ நரே மரூந்து மறந்து விட்டால் அடுத்த நரேம் சரேத்து சாப்பிடக்கடாது, அந்த நரேம் ஂள்ளது மட்டும் சாப்பிட வணெட்டும்.

-Engr Sulthan